

## Diagnóstico


Para la comprobación del Diagnóstico es necesaria la toma de muestra gota gruesa.

Realizar la punción capilar



**A**

En una laminilla colocar una gota de sangre (gota gruesa).



**B**

Colocar otra gota en la misma laminilla y hacer extendido fino.

**Dejar secar la muestra**

Formatos para toma de muestras a Casos Probables

1) N1

2) Estudios epidemiológico de ETV.

**ESQUEMA DE TRATAMIENTO PALUDISMO P. VIVAX TCR 14 DÍAS**  
Cloroquina

Primer día 10 mg por Kilogramo de peso.

Segundo hasta el cuarto día 5 mg por kilogramo de peso.

Primaquina

Del primero hasta el catorceavo día 0.25 mg por kilogramo de peso.

**Nota: El tratamiento deberá ser solo a casos confirmados estrictamente supervisado**

Para casos resistentes a la Cloroquina, el esquema será Sulfato de Quinina/Primaquina.

Otro esquema alternativo Coartem combinación oral de (Artemisinina -Lumefantrina) dos fármacos contra el Paludismo .

**todo caso confirmado debe ser detectado, diagnosticado y tratado en 72 horas.**

Para mayor información comunicarse al

Tel : 30 30 50 00 ext 35368

Correo: paludismo\_ssj@hotmail.com